

Patientkort

TEVIMBRA® (Tislelizumab)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Viktiga kontaktuppgifter

Läkare som ordinerat Tevimbra®, namn:

Telefon:

Patientens namn:

Patientens telefon:

Kontakt i akutsituation, namn:

Kontakt i akutsituation (telefon):

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket.

www.beonemedicines.se

www.beonemedicines.fi

Version 02 / 01-2026

Viktig säkerhetsinformation för att minimera risken för immun-medierade biverkningar

- Fråga läkaren om du undrar hur Tevimbra® fungerar eller varför du har ordinerats detta läkemedel.
- Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns på detta patientkort.
- Försök inte att själv behandla några symtom utan att först rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonal.
- Det är viktigt att du alltid har patientkortet med dig och visar upp det för all hälso- och sjukvårdspersonal som du träffar (t.ex personal vid akutmottagning) för att dessa lättare ska kunna ställa diagnos och behandla immunrelaterade biverkningar.

Viktig information för vårdgivare

- Denna patient behandlas med TEVIMBRA® (tislelizumab). Detta läkemedel kan orsaka immunmedierade biverkningar som kan visa sig när som helst under behandlingen och till och med efter behandlingen. Undersök patienten avseende tecken och symtom på immunmedierade biverkningar. Tidig diagnos och korrekt behandling är avgörande för att minimera eventuella konsekvenser av immunmedierade biverkningar.
- Vid misstänkta immunmedierade biverkningar ska patienten utredas för bekräftelse av etiologin och uteslutande av andra orsaker. Beroende på de immunmedierade biverkningarnas typ och svårighetsgrad kan uppehåll med tislelizumab och administrering av kortikosteroider övervägas. Specifika riktlinjer för hantering av immunmedierade biverkningar finns i produktresumén för tislelizumab.

Viktigt Var uppmärksam på allvarliga biverkningar

Tevimbra® kan ge allvarliga biverkningar som ibland kan bli livshotande och kan leda till döden. Tala omedelbart om för läkaren om du får någon av dessa biverkningar under behandlingen med Tevimbra®:

- **Inflammation i lungorna (pneumoni):** andfåddhet, bröstsmärtor, hosta.
- **Inflammation i levern (hepatit) eller andra leverproblem:** illamående, kräkningar, smärtor i höger sida av magen, dålig aptit, gulfärgning av ögon och hud, du blöder eller får blåmärken lättare än normalt, sömnlighet, mörk urin.
- **Inflammation i tjocktarmen (kolit):** diarré eller avföring oftare än normalt, svart tjärliknande klabbig avföring, blod eller slem i avföringen, svår smärta eller ömhet i magen.
- **Inflammation i njurarna (nefrit):** förändring av mängden urin och urinens färg, smärta när du kissar, smärta i njurområdet.
- **Allvarliga hudreaktioner:** feber, influensaliknande symtom, utslag, klåda, blåsor i huden eller sår i munhålan eller på andra slemhinnor.
- **Problem med hormonproducerande körtlar (särskilt binjurar, hypofys och sköldkörtel):** snabb puls, svettning, hyperaktivitet, extrem trötthet, svullnad längst ner på halsen, svullnad på framsidan av halsen, viktökning eller viktnedgång, yrsel eller svimning, förvirring, håravfall, hudförändringar, köldkänsla, förstoppning, huvudvärk som inte går över eller någon form av huvudvärk som du inte känner igen, lågt blodtryck, synförändringar, törst.
- **Diabetes mellitus typ 1:** högt blodsocker, du är hungrigare eller törstigare än normalt, kissar oftare än normalt.
- **Infusionsrelaterad reaktion:** frossa, skakningar, klåda, värmevallningar, andfåddhet, väsande andning, yrsel, feber (kan komma under infusionen eller upp till 24 timmar efteråt).
- **Muskelinflammation (myosit):** värk, stelhet eller svaghet i musklerna, bröstsmärtor, extrem trötthet.
- **Inflammation i hjärtmuskeln (myokardit):** bröstsmärtor, snabb eller oregelbunden puls, andfåddhet i vila eller under aktivitet, vätskeansamling med svullnad i ben, fotleder och fötter, trötthet.
- **Ledinflammation i lederna (artrit):** ledvärk, stelhet, svullnad eller rodnad, minskat rörelseomfång i lederna.
- **Inflammatorisk sjukdom (polymyalgia reumatika):** muskelvärk och muskelstelhet, särskilt i nacke, överarmar, handleder, armbågar och axlar, knän och höfter, skinkor eller lår.
- **Inflammation i hinnorna som omger hjärtat (perikardit):** bröstsmärtor, feber, hosta, hjärtklappning.
- **Inflammation i nerverna (Guillain-Barrés syndrom):** värk, svaghet och förlamning i armar och ben.
